

殺菌剤


オブテイン[®]
フロアブル

ペンフルフェン水和剤

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 (倍) | 使用液量 (1㎡当たり) | 使用時期 | 使用方法 | 総使用回数* |
|--------------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------|------|--------|
| 日本芝 | 葉腐病 (ラージパッチ) 疑似葉腐病 (春はげ症) 疑似葉腐病 (象の足跡) ダラースポット病 | 666 ~ 1,000 | 0.2 l | 発病前~ 発病初期 | 散布 | 2回 |
| | カーブラリア葉枯病 | 1,000 | | | | |
| | フェアリーリング病 | 666 | | | | |
| 西洋芝 (ベントグラス) | 炭疽病 | 200 | 0.1 l | | | |
| | <u>ダラースポット病</u> | 400 | 0.2 l | | | |
| | <u>フェアリーリング病</u> | 1,000 | 0.5 l | | | |
| 西洋芝 (ライグラス) 西洋芝 (バーミューダグラス) | <u>ダラースポット病</u> | 200 | 0.1 l | | | |
| | | 400 | 0.2 l | | | |
| | | 1,000 | 0.5 l | | | |

*印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

■表中の下線部分は適用拡大内容を示す

■効果・薬害等の注意事項の追加

- ゴルフ場のパッティンググリーンで使用する場合、一年生のブルーグラス類に対しては薬害を生じるおそれがあるため十分に注意する

■その他の使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと