



ミラージュ
フロアブル

殺菌剤

農林水産省登録 第22802号

テブコナゾール水和剤

®はバイエルグループの登録商標
第4640267号

芝用

ストレスガード製剤

1ℓ入

バイエル クロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業部
本社 東京都千代田区丸の内1-6-5

お客様相談室 ☎0120-575-078
(9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)

ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる

性状 暗青緑色水和性粘稠懸濁液体
成分 テブコナゾール ……21.4%
〔(RS)-1-p-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イ
ルメチル)ペンタン-3-オール
界面活性剤、水等 ……78.6%
〈PRTR〉1種 テブコナゾール…21.4%

適用病害虫と使用方法 *印は本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	1㎡当り 使用液量	使用時期	総使用 回数*	使用 方法
西洋芝 (ベントグラス)	ダラースポット病	200~250	0.1ℓ	発病前~ 発病初期	6回	散布
		500	0.25ℓ			
	炭疽病 フェアリーリング病 葉腐病 (ブラウンパッチ)	1,000	0.5ℓ			
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	400	0.2ℓ			

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振る(分離)
- はくさい、だいこんにはかからないようにする(薬害)
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい

⚠ 安全使用上の注意



- 誤飲、誤食に注意
- 散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをし、衣服を換える
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する


保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵な所

- 火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める
- 漏出時は、保護具を着用し布砂等に吸収させ回収する
- 移送取扱いは、ていねいに行う
- 飲めません ●有効年月内に使用する
- 体調の悪いとき、妊娠中、飲酒後等は取り扱い及び作業をしない

製造場 バイエルクロップサイエンス社
カンサス工場 米国 ミズーリ州 カンサス市 ホーソンロード 8400
小分製造場 バイエルクロップサイエンス株式会社
防府工場 山口県 防府市 新田 築地 2061

■ 開封方法

キャップ上部の突起をボトルのアルミシールに刺し、キャップを回して切取る。



キャップ1杯
約40ml



4 907864 003191

Bayer

JP80197519D

最終有効年月(西暦下2桁)

目盛りは目安